



Avertissements agricoles

BRETAGNE

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

280, rue de Fougères, 35700 RENNES ☎ 99 36 01 74

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES



Publication périodique

ÉDITION : CULTURES MARAÎCHÈRES, LÉGUMIÈRES ET POMMES DE TERRE

BULLETIN N° 168 -

30 novembre 1988

FICHE TECHNIQUE NETTOYAGE DE SERRE *

I. — LA FIN DE CULTURE.

• Traiter impérativement la culture avant arrachage avec :

- DICHLORVOS (Dédévap ...) s'il y a des aleurodes
- AMITRAZE (Maitac) s'il y a des acariens

Mouiller abondamment

- * Éloigner le plus possible des serres les déchets de culture.
- * Y mettre le feu ou les recouvrir avec du plastique ou de la terre ou les traiter au PARATHION.
- * Si le paillage plastique reste en place, bien balayer la serre.
- * Désherber parfaitement l'intérieur des serres (désherbage mécanique ou chimique), y compris :
 - autour des chauffages,
 - des stations de fertilisation,
 - les joints des carreaux sur les murets,
 - le pourtour intérieur et extérieur des serres.

II. — DÉSINFECTION DE LA SERRE VIDE.

- * Désinfecter les structures soit :
 - à l'eau de Javel à 4 %,
 - à l'Hortiseptyl à 1 à 3 %,
 - ou tout autre désinfectant efficace,
 - au Formol vapeur, à savoir :
mettre 500 g de Permanganate dans un récipient contenant 1,5 L de Formol et ce pour 3 à 400 m².

P48

* Texte préparé par DDAF/SPV BREST et GIE LA CROIX

- . Si, à la fin de la culture, il y avait en grand nombre :
 - . Aleurodes ou thrips : utiliser Dédévap en insistant tout autour des poteaux
 - . Acariens : Traiter au Maitac, Torque, Kelthane ... On peut aussi employer le Morestan en doublant la dose indiquée.
- Bien désinfecter le système d'irrigation.
- Prendre toutes les précautions d'usage (masque, gants, etc.) vis-à-vis des produits et de leurs vapeurs.
- En cas d'utilisation d'eau de Javel, attention aux joints sur les appareils.

III. — MESURES PROPHYLACTIQUES GÉNÉRALES.

- Rincer le goutte à goutte à l'eau acidifiée (PH = 2) puis à l'eau claire.
- Désinfecter à l'Hortiseptyl tout le matériel et petit matériel :
 - . chariots - caissettes - caisses - échasses - palettes - outils usuels et tout le matériel entrant sous serre.
- Laver les allées en béton à l'eau de Javel à 1 %.
- Nettoyer les bacs à solution.
- Désherber et nettoyer les abords.
- Ne pas salir le plastique neuf.
- Laver et désinfecter les gouttières NFT.
- Limiter le plus possible les recontaminations avec les poussières (paillage plastique ou béton sur les allées).

Dans tous les cas, les jeunes plantes devront être saines et rentrées dans des serres parfaitement propres.

CHOU DE BRUXELLES

ROUILLE BLANCHE -

Des attaques sont fréquemment signalées dans le Nord-Finistère. Utilisez préventivement Peltar (3 kg/ha), en respectant un délai minimum de 15 jours avant la récolte.

Sur attaque déclarée, aucune spécialité ne peut être préconisée.

.../...

PUCERON CENDRE -

En cas d'infestation, appliquez un insecticide polyvalent tel que : Décis B, Orthène 50, Lannate 20 L, Rogor 50, Perfekthion, etc ... en respectant les délais d'interdiction avant récolte.

CHOU-FLEUR

ALTERNARIA -

Sur variété DJ, dont la récolte est prévue en décembre ou janvier, intervenez en présence de taches sur les feuilles de la base avec Rovral (1,5 kg/ha) ou Kidan (3 l/ha). Appliquez 1 000 litres de bouillie par hectare. Respectez les délais d'interdiction avant récolte.

PUCERON CENDRE -

Surveillez vos cultures. En cas d'infestation, intervenez avec l'une des spécialités préconisées sur chou de Bruxelles, en respectant les délais d'interdiction avant récolte.